

de ces dernières, caractères consistant plus particulièrement dans l'odeur qu'il dégage et dans la nature des cristaux de certaines de ses réactions;

3° Qu'il possède ainsi que ses divers sels une énergie toxique considérable;

4° Que par tous ses effets il se rapproche étroitement à la *muscarine C<sub>5</sub>H<sub>13</sub>AzO<sub>2</sub>*, alcaloïde de l'*Ammanita muscaria*, Hall.;

5° Qu'il appartient au groupe des *leucomaines oxygénées*;

6° Qu'enfin, pour établir sa place parmi des congénères, nous proposons de l'inscrire sous le nom de *Spondylotoxine*.

---

CLAVICORNES DES îLES DE LA SONDE ET DE L'Océanie RÉCOLTÉS PAR  
M. RAFFRAY. DESCRIPTIONS D'ESPÈCES NOUVELLES DE LA COLLECTION  
DU MUSÉUM,

PAR M. A. GROUVELLE.

COLYDIIDÆ.

*Lascotonus*, n. g. *Antennæ 11-articulatæ; clava tri-articulata. Sulci anten-*  
*narum integri, convergentes. Caveæ coxarum anticarum occlusæ. Tibiæ ad*  
*apicem spinosæ.*

Nouveau genre du groupe des *Ditomini* Reitter; voisin du Genre *Lasco-*  
*notus*.

1. *L. cylindricus*, n. sp. *Elongatus, subcylindricus, setosus, rufo-fuscus,*  
*singulo elytro transversim fusco tri-maculato; capite prothoraceque granosis;*  
*thorace elongato, antice posticeque marginato, lateribus crenulatis; elytris*  
*lineato punctatis. Long. 3 mill. 1/2 à 4 millimètres. Sumatra : Collection*  
*Grouvelle. Ternate : Collection du Muséum.*

L'exemplaire du Muséum a les antennes plus épaisses et les angles antérieurs du prothorax plus dilatés et plus saillants en avant.

2. *Chorites frater*, n. sp. *Ellipticus, niger, flavo-griseo fuscoque squa-*  
*mosus; prothorace transverso, antice angustato, apice profunde lateque emar-*  
*ginato, stria marginali basis fortiter impressa, utrinque abbreviata; margi-*  
*nibus lateralibus reflexis. Long. 5 à 6 millimètres.*

Java : Collections du Muséum et Grouvelle. Très voisin de *C. oblongus* Pasc.; mais moins allongé, plus rétréci en arrière et plus gibbeux. Élytres plus distinctement striés près de la suture; squamules plus courtes.

3. *Metopiastes vicinus*, n. sp. *Niger, vix nitidus, subcylindricus; antennis*  
*fuscis; fronte haud tomentosa; prothorace dense punctato; elytris quadri-co-*  
*tatis, intervallis irregulariter punctatis, costis ad apicem magis elevatis.*  
Long. 6 à 7 millimètres.

Dorey : Collection du Muséum.

Voisine comme taille et comme forme de *M. hirtifrons* Pasc. également de Dorey : s'en distingue par le front sans pubescence et par la ponctuation des intervalles des carènes des élytres irrégulière, mais nette et profonde.

4. *Petalophora* Raffrayi, n. sp. *Nigra, subnitida, prothorace præcipue versus apicem fortiter et sat dense rugoso-punctato, haud canaliculata; elytris lineato-punctatis, intervallis alternis elevatis.* Long. 10 millimètres.

Dorey : Collection du Muséum.

5. *Emmaglœus* Raffrayi, n. sp. *Nigro-brunneus, squamis sordito-albidis dense indutus; margine antico prothoracis medio in duobus lobis producto, elytris in longitudinem bi-carinatis, carinis fasciculatis.* Long. 5 à 7 millimètres.

Dorey : Collection du Muséum.

#### RHYSODIDÆ.

6. *Rhysodes parvus*, n. sp. *Fuscus, nitidus; capite triangulare, angulis posticis rotundatis; spatio inter sulcos frontales retrorsum producto, basin capping superante; prothorace elongato, costis sat latis, subconvexis; elytris septem punctato-striatis.* Long. 4 mill. 1/2.

Dorey : Collection du Muséum.

7. *Rhysodes humeralis*, n. sp. *Nigro-piceus, nitidus; capite triangulare, angulis posticis rotundatis, spatio inter sulcos frontales elongato, postice abbreviato, antice vix foveolato; prothorace elongato, costis sat latis, subconvexis, sulco intermedio medio constricto; elytris septem punctato-striatis.* Long. 5 mill. 1/2.

Célèbes : Collection du Muséum.

8. *Rhysodes gracilicornis*, n. sp. *Fuseo-castaneus, nitidus; capite elongato, angulis posticis rotundatis, spatio inter sulcos frontales depresso, satis lato, postice abbreviato, apice foveolato; oculis oratis, prothorace elongato, costis sat latis, subconvexis, sulco discoidali basin versus fere occluso; elytris septem punctato-striatis.* Long. 4 mill. 1/2.

Dorey : Collection du Muséum.

9. *Rhysodes vicinus*, n. sp. *Nigro-piceus, nitidus; capite subtriangulari, subelongato, angulis posticis rotundatis; spatio inter sulco frontales postice abbreviato, antice constricto, apice foveolato, oculis angulosus; costis prothoracis sat latis, subconvexis, sulco discoidali lateralibus angustiore; elytris septem punctato-striatis.* Long. 6 millimètres.

Dorey : Collection du Muséum.

10. *Rhysodes capito*, n. sp. *Niger, nitidus; capite subtriangulari, angulis posticis lobo productis, spatio inter sulcos frontales elongato, antice haud fo-*

*veolato; oculis angulosis; costis prothoracis latis, subconvexis; sulco discoidali medio constricto; clytris septem punctato-striatis.* Long. 7 millimètres.

Dorey : Collection du Muséum.

Pour mieux définir les caractères distinctifs des cinq espèces de Rhysodes que nous venons de décrire, nous les avons groupées dans le tableau suivant :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Sillons longitudinaux de la tête entièrement séparés,<br>renfermant une partie saillante s'avancant en arrière<br>à la base de la tête en un lobe saillant, intervalles des<br>stries pas plus larges que les stries..... | parvus Grouv.                            |
| Sillons longitudinaux de la tête réunis en un court<br>sillon occipital.....   | 2  |
| 2. Angles postérieurs de la tête fortement saillants en arrière;<br>intervalles des élytres plus larges que les stries.<br>Angles postérieurs de la tête arrondis.....   | capito Grouv.<br>3                       |
| 3. Intervalles des élytres plus larges que les stries.....<br>Intervalles pas plus larges que les stries.....  | humeralis Grouv.<br>4                    |
| 4. Tête notablement plus longue que large; sillon médian<br>du prothorax fermé à la base.....<br>Tête à peine plus longue que large, sillon médian du<br>prothorax fermé à la base.....                                      | gracilicornis Grouv.<br>5 vicinus Grouv. |

Rhyzodiastes Raffrayi, n. sp. *Nigro-piceus, nitidus, capite subelongato,*  
*subquadrato, in longitudinem profunde sulcato, sulco antice bifurcato, spatium*  
*elongatum et antice foveolatum includente; prothorace oblongo, in longitudinem*  
*tri-sulcato, sulcis externis juxta marginem lateralem incrassatum, discoidali*  
*integrum, intervallis concavis; singulo elytro tri-carinato, carina interna an-*  
*tice posticeque abbreviata, humerali integra, lateralí apicem attingente.* Long.  
5 millimètres.

Célèbes : Collection du Muséum.

#### CUCUJIDÆ.

Læmophlœus insolens, n. sp. *Ovatus, convexus, nitidus, glaber, testaceus;*  
*antennis elongatis apice haud incrassatis, articulis 2 et 3 subæqualibus; capite*  
*transverso, margine antico sinuato, lateribus elevatis; prothorace subtransverso,*  
*cordato, utrinque unistriato; scutello transverso; clytris ovatis, prothorace la-*  
*tioribus, ad apicem separatim subacuminatis, lateribus explanatis, stria su-*  
*turali ad apicem et humerali basin versus impressis.* Long. 2 mill. 1/2.

Dorey : Collection du Muséum.